

OLGU SUNUMLARI İLE LENFADENOMEGALİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Mustafa ÇETİNER

VKV Amerikan Hastanesi Hematoloji Bölümü, İstanbul

Bu bölümde olgu sunumları tartışılacak ve bu tartışma olabildiğince katılımcıların aktif katılımı ile yapılacaktır. Bu nedenle kongre kitapçığına olgular konulmamıştır.

Bu bölümde; lenfadenopati saptanan olgulara genel yaklaşım ile ilgili ayrı bir konuşma olduğundan sadece kısa ve pratik bir yaklaşım biçiminden söz edilecek, tartışılacak olgulara değinilmeyecektir.

Lenfadenopati saptanan hastaya pratik yaklaşımda “**CHICAGO**” kuralı kolay hatırlanabilir ve ayırıcı tanıda kullanılabilir bir yöntemdir.

Buna göre ayırıcı tanı yapılırken aşağıdaki hastalık grupları gözden geçirilmelidir;

- C:** Cancer
- H:** Hypersensitivity
- I:** Infections
- C:** Connective tissue disease
- A:** Atypical lymphoproliferative disease
- G:** Granulomatous disorders
- O:** Other unusual causes of LAP

Ayırıcı tanıda lenfadenopati yapan bu temel hastalıklar yanında bazı klinik özellikleri de belli bir sıra ile değerlendirmek tanisal açıdan önemlidir. Bu yaklaşımda yine İngilizce “**ALL AGES**” sözcüğünden yönlendirici klinik bulguları akılda tutabilirsiniz.

Buna göre;

A: Age

L: Location

L: Length of time present

A: Associated signs and symptoms

G: Generalize Lymphadenopathy

E: Extranodal associations

S: Splenomegaly

Lenfadenomegalisi olan hastaya yaklaşım ile ilişkili yukarıda anılan pratik yaklaşım kliniğinin hızlı ve doğru değerlendirilmesine katkıda bulunabilir. Konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler ilgili bölümde anlatılacaktır.